

کرانیوتومی شامل باز کردن جمجمه توسط عمل جراحی جهت دسترسی به ساختمان های داخل جمجمه می باشد. این روش برای برداشتن تومورهای مغزی یا کاهش فشار داخل جمجمه یا خارج کردن لخته از داخل مغز و کنترل خونریزی استفاده می شود. جراح جمجمه را برش می دهد تا تکه استخوانی را به اندازه مورد نظر بردارد پس از جراحی تکه جنس سیم یا سیمان مخصوص در جای خود قرار می گیرد و توسط بخیه از اکثر موارد جراحی های مغزی به همین روش انجام می گیرد و بسته به محل ضایعه محل برش جراحی متفاوت است.

مراقبت پس از جراحی:

* پس از جراحی مراقبت از زخم بسیار مهم است. تعویض بانسمان بسیار مهم است و حداقل باید یک روز در میان انجام شود. هنگامی که بیمار از بیمارستان مرخص شده و در منزل است باید نهایت توجه و مراقبت از زخم بعمل آید.

* داروهای تجویز شده توسط پزشک باید به دقت مصرف شوند

* بخیه های جراحی باید دو هفته پس از جراحی برداشته شوند در طول این مدت از خاراندن یا مالش شدید زخم و اطراف محل بخیه ها پرهیز شود

* شستشوی سر پس از 72 ساعت یا روز سوم پس از عمل بلامانع است ولی باید از مالش پوست محل عمل خودداری شود

مراقبت در منزل:

• زخم همواره خشک و تمیز نگه داشته شود

• از چرخاندن بیش از حد سر خودداری کنید .

• در صورت داشتن احساس طعم شوری در دهان یا ترشح از ناحیه ی جراحی، سریعاً به پزشک مراجعه کنید .

• از سرفه، عطسه، باد انداختن در بینی خودداری کنید ، چون این اعمال موجب فشار بر ناحیه ی جراحی می شود.

• در صورتی که مشکل دیگری از نظر سلامتی نداشته باشید، رژیم غذایی محدودیت خاصی ندارد. رژیم پرفیبر (سبزی و میوه جات) جهت پیشگیری از یبوست و جلوگیری از زور زدن هنگام دفع پیشنهاد می گردد

• داروهای تجویز شده توسط پزشک (علی الخصوص آنتی بیوتیک ها و ضد تشنج ها)، حتماً در ساعت مقرر استفاده گردد.

• مهم ترین خطر پس از جراحی بروز علائم کاهش سطح هوشیاری ناشی از ایجاد خونریزی یا بالا رفتن فشار داخل جمجمه به دلایل مختلف است بیمار ممکن است نتواند از دستورات ساده هم پیروی کند ممکن است زمان مکان یا اشخاص را نشناسد یا جواب های بی ربط به سوالات دهد. بسیار مهم است که در صورت بروز کاهش در سطح هوشیاری بیمار فوراً به پزشک اطلاع داده شود.

• خطر بروز تشنج همواره پس از اعمال جراحی مغزی وجود دارد و با وجود داروهایی که پس از عمل جراحی

برای بیمار تجویز می شود باز هم ممکن است این اتفاق در ماهها وسالهای بعد رخ دهد بنابراین لازم است اقدامات زیر در منزل مورد توجه قرار گیرد :

✓ بیمار را در وضعیت راحت روی زمین قرار دهید. در زمان بروز تشنج همواره خطر سقوط از تخت وجود دارد.

✓ بیمار را به پهلو بخوابانید.


✓ وسایل و اشیاء نوک تیز را از اطراف بیمار دور کنید

• در زمان استراحت یا خوابیدن سر و تنه بالاتر قرار گیرد این وضعیت را می توان با قرار دادن دو بالش مناسب زیر تنه و سر و حفظ وضعیت سر در حالت مناسب انجام داد این کار کمک زیادی در جلوگیری از افزایش فشار داخل جمجمه و بروز عوارض خطرناک می کند



• مراقبین در منزل باید آموزش و آگاهی کافی از انجام فعالیت های مراقبتی در منزل را داشته باشند. مراقبین منزل باید از عوارض و علائم پس از جراحی بخوبی آگاه باشند

• بی حرکتی طولانی مدت در دست و پا می تواند خطر بروز لخته در پاها را افزایش می دهد که عوارض جبران ناپذیری را بوجود می آورد در صورت نیاز از یک



تخلیه خونریزی های

مغزی

(با بازکردن قسمتی از جمجمه)

آدرس سایت بیمارستان:

www.nekuei.muq.ac.ir

واحد آموزش

۵. در زمان بستری در بخش با صدای آرام صحبت کرده تا باعث مزاحمت دیگران نشوید

۶. در صورت داشتن علائم التهاب و عفونت مثل : تب بالای ۳۸/۳ بیشتر از دو روز متوالی ، قرمزی ، تورم و سفت شدن محل عمل ، ترشحات زرد و بد بو و حساسیت و درد اطراف زخم ، سفتی گردن به پزشک خود مراجعه نمائید و همچنین به کارشناس کنترل عفونت (۳۷۱۱۸۲۵۸) اطلاع دهید

***نسخه دارویی را تهیه و در زمان توصیه شده به**

شرح ذیل مصرف نمائید:

۱.....
۲.....
۳.....

نام پزشک معالج شما :

.....

تاریخ پیگیری های بعدی و مراجعه به

پزشک معالج:

.....

با آرزوی سلامتی هر چه سریعتر برای شما مرزبوی

گرامی

متخصص فیزیوتراپی برای انجام تمرین و فعالیت های ورزشی موثر مشورت بگیرید.

● رژیم غذایی بیمار براساس تجویز پزشک برای بیمار تنظیم می شود از مصرف مایعات زیاد پرهیز شود مصرف نمک را طبق توصیه پزشک متعادل نمائید

● به دلیل مصرف کورتون ها پس از جراحی مانند دگزامتازون سیستم ایمنی بیمار ضعیف شده و بیمار مستعد بروز عفونت های مختلف است.

در این خصوص لازم است افراد مبتلا به عفونت های میکروبی و ویروسی تنفسی کمتر با بیمار در تماس باشند

● از کلاه های ایمنی محافظ، جهت جلوگیری از ضربه به سر استفاده کنید.

نکات بهداشتی درمانی پیشگیرانه مهمی که

بیماران بایستی رعایت کنند :

۱. شستن به موقع دستها با آب و صابون بعد از استفاده از سرویس بهداشتی ، قبل از صرف غذا و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی واضح در دست ها
۲. رعایت بهداشت فردی ، شستشوی به موقع سر و بدن برای جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع در بدن
۳. از دستکاری زخم پرهیز نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل به پزشک معالج مراجعه نمائید
۴. عدم استعمال دخانیات به منظور بهبود هر چه سریع تر بیماری